

ACC 600 OPTIMA 600mg 10 szt.

Cena: 21,75 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabl. (tub.)
Postać	tabl.mus.
Producent	SANDOZ GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

ACC 600 OPTIMA 600mg 10 tabletek musujących

ACC Optima to lek mukolityczny na mokry kaszel. Zawiera acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. Lek wykrztuśny ACC Optima ma postać tabletek musujących i jest dostępny bez recepty.

ACC Optima to lek wykrztuśny (mukolityk) na mokry kaszel, który zawiera acetylocysteinę. Acetylocysteina ma działanie sekretolityczne (upłynnia wydzielinę) i sekretomotoryczne (ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych).

Lek na kaszel mokry ACC Optima stosuje się krótkotrwale, jako lek mukolityczny rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych. ACC Optima ułatwia odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Skład:

Substancją czynną leku jest acetylocystelna.

1 tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan, bezwodny, mannitol, laktoza, bezwodna, kwas askorbowy, sacharyna sodowa, sodu cyklamianian, sodu cytrynian, dwuwodny, aromat jeżynowy „B”.

Dawkowanie:

Lek mukolityczny ACC Optima należy stosować zgodnie z informacją zawartą w ulotce lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: 1 tabletkę musującą raz na dobę (600 mg acetylocysteiny) po posiłku

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku wykrztuśnego ACC Optima dłużej niż 4 do 5 dni.

Sposób podawania:

Tabletkę musującą należy rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Ten lek na kaszel należy



przyjmować po posiłku, nie później niż 4 godziny przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.

UWAGA:

Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą.
Nie zaleca się rozpuszczania leku ACC Optima w roztworach zawierających inne leki.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku ACC Optima:

Jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku wykrztusznego ACC Optima, jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, jeśli pacjent ma ostry stan astmatyczny, jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję galaktozy.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, ACC Optima może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku na kaszel ACC Optima i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną: reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną (nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła, pokrzywka, świąd); obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów; powstawanie zmian w obrębie skóry i błon śluzowych, może przebiegać z gorączką i bólem stawów; skurcz oskrzeli (nagła duszność).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne); ból głowy; szumy uszne; przyspieszone bicie serca (tachykardia); obniżone ciśnienie tętnicze krwi; nudności, wymioty, biegunka, ból brzuch; zapalenie jamy ustnej; pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy; gorączka.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niestrawność; duszność, skurcz oskrzeli.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego; ciężka reakcja dotycząca skóry i błon śluzowych; krwotok.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku mukolitycznego na kaszel mokry ACC Optima należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: pacjent chorował lub choruje przewlekle na astmę oskrzelową; u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową; pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości niewydolność oddechową; pacjent ma problem z odkrztuszaniem; u pacjenta stwierdzono nietolerancję histaminy; pacjent ma powyżej 65 lat.

Mukolityk ACC Optima zawiera laktozę i sól.

Stosowanie innych leków:

Nie należy stosować leku ACC Optima z lekami przeciwkaszlowymi.

Ten lek mukolityczny może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów.

Lek na kaszel ACC Optima może osłabiać działanie niektórych antybiotyków. Należy go przyjmować 2h po zażyciu antybiotyku.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem:

Lek na kaszel ACC Optima należy przyjmować po posiłku.

Podczas stosowania tego mukolityku należy spożywać co najmniej 1,5 l płynów.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku wykrztusznego na kaszel.

Lek ACC Optima można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Wpływ na badania laboratoryjne:



Jeśli pacjent ma mieć wykonane oznaczenie salicylanów we krwi lub moczu albo ciał ketonowych w moczu, należy poinformować lekarza i personel medyczny o przyjmowaniu leku ACC Optima.

Wpływ na płodność:

Nie jest znany wpływ leku ACC Optima na płodność.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Leku ACC Optima na kaszel mokry nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie jest znany wpływ leku ACC Optima na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.