

ACETYLCYSTEINUM FLEGAMINA 600mg 10 tabl. musujących

Cena: 12,99 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	TEVA B.V.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

ACETYLCYSTEINUM FLEGAMINA 600mg 10 tabl. musujących

Acetylcysteinum Flegamina zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która jest lekiem rozrzedzającym uporczywy śluz w drogach oddechowych.

Lek jest wskazana u młodzieży w wieku powyżej 14 lat i dorosłych do rozrzedzania śluzu i ułatwiania jego odkrztuszenia w zapaleniu oskrzeli wywołanym przeziębieniem z towarzyszącą uporczywą wydzieliną dróg oddechowych i zmniejszonym transportem śluzu. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Wskazaniem do stosowania jest zalegająca wydzielina w drogach oddechowych podczas zapalenia oskrzeli.

Skład:

1 tabletkę musującą zawiera:

Substancję czynną: 600 mg acetylocysteiny,

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas adypinowy, powidon K-25, aspartam (E 951), aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, sacharozę, gumę arabską (E 414), triacetynę (E 1518), alfa-tokoferol (E 307)).

Dawkowanie:

Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli: 1 tabletkę raz na dobę.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody, a następnie wypić zawartość całej szklanki.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Nie stosować dłużej niż 5 dni.

Przeciwwskazania:



Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Z powodu znacznej zawartości substancji czynnej, leku Acetylcysteinum Flegamina nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Dla tej grupy pacjentów dostępne są leki o odpowiedniej mocy.