

AESCIN 20mg 30 tabl. dojelitowych

Cena: 15,49 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Escinum

Opis produktu

AESCIN 20mg 30 tabl. dojelitowych (importer równoległy)

Informacje ogólne:

Lek Aescin stosowany jest w przewlekłej niewydolności żylnaj.

Leczenie przewlekłej niewydolności żylnaj, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, zapalenia żył kończyn dolnych, profilaktyka i leczenie krwaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Działanie:

- przeciwobrzękowe i przeciwzapalne,
- poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych,
- zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych,
- przyspiesza wchłanianie krwaków pourazowych oraz zmniejsza ryzyko ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym,
- poprawia krążenie żylnolimfatyczne,
- zapobiega zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym.

Skład:

1 tabletkaj zawiera 20 mg alfa-escyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian. Otoczkaj: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbitat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetylocelulozaj, żółciel pomarańczowaj (E 110), silikonowaj emulsjaj przeciwpienna.

Dawkowanie:

Zazwyczaj stosujesj 2 tabletki 3 razy na dobę, po posiłku. Po 2-3 miesiącach leczenia stosujesj leczenie podtrzymujęcuj w dawce 2 tabletek 2 razy na dobę.

Brak danych odnośnie stosowania preparatu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Przed zabiegiem chirurgicznym preparat należuj odstawić co najmniej na 16-godzinnym wyprzedzeniu.

Leku nie stosowacj poniżej 18 roku życia.



Przeciwwskazania:

- uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- ciężka niewydolność nerek,
- ciąża oraz karmienie piersią.