

ALUGASTRIN zawiesina doustna 0,34g/5ml 250ml



Cena: 25,87 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aluminium hydroxidum

Opis produktu

ALUGASTRIN zawiesina doustna 0,34g/5ml 250ml

Alugastrin to lek w formie zawiesiny doustnej, który łagodzi dolegliwości bólowe związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Alugastrin powoduje zobojętnienie nadmiaru kwasu solnego w soku żołądkowym.

Alugastrin działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy dzięki czemu łagodzi dolegliwości bólowe w nadkwaśności soku żołądkowego. Lek nie wywołuje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego a także wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego.

Alugastrin jest stosowany w leczeniu objawowym: nadkwaśności soku żołądkowego, uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
Smak miętowy.

Skład:

Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węgiel (Dihydroksyaluminii natrii carbonas).
15 ml leku zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-sodowego węgla.

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekryształujący, guma ksantan, metylu parahydroksybenzoesan, symetykon (emulsja), propylu parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, chloroheksydyny diglukonian, roztwór, olejek mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 łyżka stołowa (15 ml) godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.
Lek do stosowania doustnego.
Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po upływie 14 dni u dorosłych, a w przypadku dzieci po 7 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej



Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Alugastrin:

jeśli pacjent ma uczulenie na węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

kredowy posmak,
łagodne zaparcia,
skurcze żołądka.

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

nudności lub wymioty,
białawe zabarwienie kału.

- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

ciągłe zaparcia,
utrata apetytu,
niezwykła utrata masy ciała,
osłabienie mięśni,
utrata fosforanów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.

Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii (glin zawarty w leku wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki).

Lek zawiera w 1 dawce 162 mg sodu, co należy uwzględnić w przypadku pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u osób kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek można stosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.

Stosowanie innych leków:

Alugastrin może wchodzić w interakcje z:

lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasów żołądkowych (ranitydyna),
fentyoiną,

fluorochinolonami (np. cyprofloksacyna),

glikozydami nasercowymi (lekami stosowanymi w niewydolności serca, np. digoksyna),

ketokonazolem,

tetracyklinami,

salicylanami (leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym, często stosowanych na przeziębienie),

preparatami żelaza (leki stosowane przy niedokrwistości spowodowanej niedoborami żelaza),

sukralfatem - zmniejszenie skuteczności działania

lekami o działaniu przeciwdrgawkowym i antyarytmicznym.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm:

Wskazane jest przyjmowanie leku Alugastrin po posiłkach lub między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, Alugastrin może być stosowany jedynie w przypadku uzasadnionej



konieczności. Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Alugastrin można stosować u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

U dzieci poniżej 6 roku życia można zastosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.