

ANAFTIN żel

Cena: 19,35 PLN



Opis produktu

ANAFTIN żel na afty i niewielkie rany w jamie ustnej

Zawarte w preparacie poliwinylpirolidon (PVP) i kwas hialuronowy tworzą warstwę ochronną pokrywającą jamę ustną, która pełni rolę ochrony mechanicznej dla uszkodzonych okolic jamy ustnej. Dzięki temu łagodzi ból wywołany podrażnieniem odsłoniętych zakończeń nerwowych. Zawarte w składzie kwas hialuronowy i aloes wspomagają naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek.

Wskazania

Anafitin® Żel łagodzi dolegliwości bólowe wywołane przez niewielkie zmiany w jamie ustnej, takie jak aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również zmiany wywołane przez aparaty ortodontyczne i źle' dopasowane protezy. Jest również wskazany do stosowania w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych.

Skład:

Poliwinylpirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, PEG-40, olej rycynowy uwodorniony, guma ksantanowa, sorbinian potasu, benzoosan sodu, hialuronian sodu, aromat, chlorek benzalkonium, wersenian disodu (EDTA), sacharynian sodu, dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), woda.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

Nałóż 1 lub 2 krople żelu na okolicę owrzodzenia lub zmiany. Unikaj bezpośredniego kontaktu aplikatora ze zmianą. Nie dotykaj zmiany językiem przez co najmniej 2 minuty, aby mogła utworzyć się warstwa ochronna. Zakręć tubkę po każdym użyciu. Dla uzyskania najlepszych rezultatów unikaj jedzenia i picia przez co najmniej 1 godzinę po użyciu.

Stosować 3-4 razy dziennie lub częściej, jeśli to konieczne.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Każda tubka produktu Anafitin Żel powinna być używana tylko przez jednego pacjenta, aby uniknąć zanieczyszczenia aplikatora i żelu. Stosowanie produktu Anafitin® Żel jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. W przypadku częstych nawrotów owrzodzeń jamy ustnej wskazana jest konsultacja lekarska.