

APAP PRZEZIĘBIENIE 8 sasz.



Cena: 20,44 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	8 sasz.
Postać	pr.do p.roztw.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Acidum ascorbicum, Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu

APAP PRZEZIĘBIENIE 8 sasz.

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Wskazania:

Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie.

Skład:

Paracetamol 650 mg + kwas askorbowy 50 mg + chlorowodorek fenylefryny 10 mg
Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian sodu, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 875060, acesulfam K

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godz. (maksymalnie 6 saszetek na dobę). Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenylketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu