

BAIKADERM krem 35g



Cena: 14,08 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	35 g
Postać	krem
Producent	WROCLAWSKIE ZAKLADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Scutellariae baicalensis rad. extractum, Allantoinum

Opis produktu

BAIKADERM krem (1,33g+1g)/100g 35g

Informacje ogólne:

Baikaderm jest to krem zawierający zespół flawonów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej (*Scutellaria baicalensis* G.) oraz alantoinę. Działanie przeciwzapalne zespołu flawonów oparte jest na hamowaniu syntezy komórkowych mediatorów zapalenia. Ponadto zespół flawonów hamuje wydzielanie histaminy i zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, dzięki czemu łagodzi obrzęk towarzyszący stanom zapalnym. Alantoina działa przeciwzapalnie poprzez zmniejszenie napływu komórek zapalnych. Ponadto alantoina korzystnie wpływa na proces gojenia i regeneracji skóry, zwiększając wytwarzane kolagenu w miejscu uszkodzenia oraz stymuluje tworzenie nowej tkanki o prawidłowej strukturze.

Wskazania do stosowania:

- leczeniu stanów zapalnych skóry objawiających się zaczerwienieniem, obrzękiem, świądem, bólem i suchością, w tym także w stanach zapalnych o nieznannej etiologii bez przerwania ciągłości skóry,
- łagodzeniu podrażnień skóry powstałych w wyniku np. ukąszenia owadów, depilacji, niewielkich otarć naskórka, lekkich oparzeń termicznych i słonecznych, zmian rumieniowych powstałych w następstwie ekspozycji skóry na promienie UV np. po fototerapii oraz podrażnień skóry środkami chemii gospodarczej,
- leczeniu uzupełniającym w terapii trądziku grudkowo-krostkowego.

Skład:

100 g kremu zawiera:

Substancje czynne:

Zespół flawonów izolowanych z korzenia *Scutellaria baicalensis* 1,33 g

Alantoina (Allantoinum) 1,00 g

Substancje pomocnicze: Polioksyetylenowany alkohol cetylowo-stearylowy, glicerolu monostearnian, alkohol stearylowy, oktylu stearynian, kaprylu trójglicerynian, decylu oleinian, glicerol (E 422), karbomer, sodu węglan bezwodny, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Sposób użycia:



Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia (zewnętrznie): jednorazowo stosować na nieuszkodzoną skórę słupek kremu o długości ok. 2 cm. Smarować kremem zmienione chorobowo miejsca 3 – 4 razy dziennie.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uszkodzeń skóry oraz nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.

Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 lat.

Ze względu na nieznane ryzyko stosowania preparatu na skórę u kobiet w okresie ciąży i karmienia, nie zaleca się stosowania w tych okresach.