


BALS SULPHUR ŻEL 300g



Cena: 37,67 PLN

Opis produktu

BALS SULPHUR ŻEL 300g

Zastosowanie:

Lek w postaci żelu do stosowaniu w bólach i urazach stawów. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Leczy urazy narządu ruchu, poprawia sprawność ruchową. Można stosować do zabiegów jonoforezy i fonoforezy siarczkowej.

Wskazania do stosowania:

- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
- reumatoidalne zapalenie stawów pomocnicza
- bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo-krzyżowe,
- bóle i obrzęki po stłuczeniach i zwichnięciach,
- rehabilitacja po urazach narządu ruchu.

Bals sulphur żel zawiera aktywne biologicznie składniki solanki siarczkowej: siarkę dwuwartościową, jony wodorosiarczkowe, siarkę koloidalną, jony wapnia, magnezu, jodu, bromu i inne cenne mikroelementy. Żel aplikowany miejscowo działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, zwiększa resorpcję ognisk zapalnych poprzez poprawę mikrokrążenia w tkankach. Związki siarki zaabsorbowane ze skóry biorą udział w syntezie kwasu chondroitynosiarczkowego – składnika budulcowego chrząstki stawowej. Solanka siarczkowa w kontakcie ze skórą tworzy tzw. „płaszcz solny”, co powoduje zmniejszenie pobudliwości zakończeń nerwowych oraz lepsze wchłanianie cennych składników leczniczych. Leczenie żelem zmniejsza ból przy ruchach i chodzeniu. Redukuje dolegliwości po skręceniach, złamaniach i zwichnięciach, przyspiesza powrót prawidłowej funkcji ruchowej stawów. Stosowanie żelu bals sulphur nie obciąża układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Mogą być nim leczeni pacjenci z przeciwwskazaniem do klasycznych kąpiei siarczkowych.

Skład:

W 100 g produktu leczniczego znajduje się: substancja czynna: 96,5 g 2,1% wody chlorkowo-sodowej (solanki) siarczkowej, jodkowej z odwiertu Szyb Soleck. Substancje pomocnicze: etanol 96%; mentol; etyl hydroksybenzoesan; metyloceluloza qs.



Sposób użycia:

Żel wcierać w skórę 2-3 razy na dobę w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się stosować w powtarzalnych seriach 2-3 tygodniowych.

Żel może być stosowany w zabiegu jonoforezy siarczkowej (katoda) oraz fonoforezy (ultradźwięki +bals sulphur żel) w chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.