


BORELIFRATIN FORTE 30 sasz.

Cena: 11,90 PLN



Opis produktu

Borelifratin forte - naturalne wsparcie organizmu w ziołowej herbatce

Bonifraterska herbatka wspierająca **prawidłowe funkcjonowanie organizmu**. Dzięki unikalnej kompozycji surowców o wielokierunkowym działaniu, herbatkę można zastosować w wielu dolegliwościach: jako wsparcie pamięci i koncentracji, **poprawa sprawności umysłowej**, prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych oraz **ułatwienie eliminacji wody z organizmu**, wsparcie układu kostno-stawowego i pracy pęcherzyka żółciowego. Ponadto herbatka pozytywnie wpływa na **metabolizm węglowodanów**, **układ krążenia**, **dba o zdrowie żył** oraz obniża poziom cholesterolu. Obecność naturalnych składników (**wiązówka błotna**, **tarczycza bajkalska**, **lucerna**, **miłorząb japoński**, **szczęć**, **pokrzywa**, **lebiodka**, **wąkrota**, **arcydziegiel**) pozwala na bezpieczne zastosowanie herbatki w wyżej wymienionych dolegliwościach. Regularne stosowanie herbatki bonifraterskiej uchroni komórki i tkanki przed stresem oksydacyjnym.

Borelifratin Forte jest ziołową herbatką przygotowaną na podstawie tradycyjnej zakonnej receptury Braci Bonifratrów.

Skład:

Kwiat wiązówki błotnej (*Filipendula ulmaria flos*), korzeń tarczyczy bajkalskiej (*Skutellaria baicalensis radix*), ziele lucerny (*Medicago sativa herba*), liść miłorzębu japońskiego (*Ginkgo biloba folium*), korzeń i ziele szczeci (*Dipsacus fullonum radix cum herba*), liść pokrzywy zwyczajnej (*Urtica dioica folium*), ziele lebiodki (*Organi herba*), ziele wąkroty azjatyckiej (*Centella asiatica herba*), korzeń arcydziegla (*Angelicae radix*).

Dawkowanie:

Sposób użycia: saszetkę ziół zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem około 10 minut. Pić trzy razy dziennie po szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakiegokolwiek składnik preparatu. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli jednocześnie przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz kobiet karmiących i



ciężarnych.