

## BUTINER 500 30 tabl.

Cena: 43,99 PLN



### Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.o zmod.uwal.
Producent	NERR PHARMA SP.Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### BUTINER 500 30 tabl. powlekanych

Butiner to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania w przypadku zaburzeniach czynnościowych jelit (zespół jelita drażliwego - IBS), chorobach zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), zakażeniach przewodu pokarmowego, bieguncie poantybiotykowej, bieguncie podróży, zaburzeniach flory jelitowej, niedoborach kwasu masłowego (np. przy stosowaniu diety ubogoresztkowej zawierającej małe ilości błonnika pokarmowego).

Preparat zawiera maślan sodu, który jest podstawowym składnikiem odżywczym dla kolonocytów - komórek nabłonka jelita grubego.

Specjalna otoczka tabletki chroni kwas masłowy przed działaniem soku żołądkowego i zabezpiecza przed wchłonięciem w jelicie cienkim. Unikalna forma tabletek dojelitowych o kontrolowanym uwalnianiu zapewnia, że cała ilość maślanu sodu – 500 mg dostaje się do jelita grubego.

#### Skład:

Maślan sodu - 500mg (400mg kwasu masłowego w każdej tabletkie)

Maślan sodu, substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: fosforan wapnia, otoczka (substancja glazurująca: anionowy kopolimer metakrylanu, substancje przeciwzbrylające: polisorbata 80, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca: cytrynian trietylowy), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

#### Dawkowanie:

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia:

1 tabletkę dziennie najlepiej w trakcie posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie rozgryzać!

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby



niemające określonej choroby, zaburzeń lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie. Nie stosować u osób z zaburzeniami połykania lub gdy połykanie tabletek sprawia trudność.