

CHLORCHINALDIN 20 tabl.

Cena: 15,49 PLN



Opis produktu

CHLORCHINALDIN 20 tabl. do ssania

Chlorchinaldin VP to produkt leczniczy do stosowania miejscowego w zakażeniach jamy ustnej, dziąseł, gardła i w pleśniawkach. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe. Wskazaniami do stosowania są: zakażenia bakteryjne jamy ustnej i dziąseł, pleśniawki, zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Skład:

Substancją czynną jest: chlorochinaldol (Chlorquinaldolum).

1 tabletkę zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian.

Dawkowanie:

Lek do stosowania w jamie ustnej.

1 tabletkę ssać co 1-2 godziny. Nie stosować więcej niż 10 tabletek na dobę. Tabletek nie należy rozgryzać. Nie należy stosować leku przez długi okres.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

-Częstość nieznana: podrażnienie błony śluzowej, objawy alergiczne, świąd, wysypka lub pokrzywka u osób nadwrażliwych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku uczulenia na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lek zawiera sacharozę - nie stosować bez porozumienia z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają przez kilka dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Chlorchinaldin stosuje się również pomocniczo w przypadku zakażeń bakteryjnych wymagających zastosowania antybiotyku doustnego.



Stosowanie innych leków:

Chlorchinaldin może wchodzić w interakcje z:
związkami metali, związkami jodu (mogą osłabiać działanie Chlorchinaldin).

Stosowanie leku z jedzeniem i pić:

Nie stosować leku podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią:

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.