

CICATRIDINA globulki dopochwowe 10 szt.

Cena: 29,49 PLN



Opis produktu

CICATRIDINA globulki dopochwowe 10 szt.

Zastosowanie:

Preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy, wywołanej również niedoborem estrogenów.

Cicatridina przyspiesza zabliznianie się ran w pochwie; przywraca naturalny proces gojenia; odbudowuje błonę śluzową pochwy w procesach atrofii i dystrofii; łagodzi takie objawy jak: uczucie napięcia i suchości pochwy, świąd, pieczenie, bóle przy współżyciu płciowym - już w pierwszym tygodniu stosowania.

Skład:

Sól sodowa kwasu hialuronowego 5mg, Centella asiatica-wyciąg olejowy, wyciąg olejowy z nagietka, wyciąg olejowy z aloesu, olejek z drzewa herbacianego, glicerydy półsyntetyczne, BHT.

Dawkowanie:

Po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemo- i radioterapii – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10-20 dni.

Przy suchości pochwy, w okresie przed i menopauzalnym, stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień

Cicatridina globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.