

## CIRRUS DUO 5mg+0,12g 6 tabl.

Cena: 14,90 PLN



### Opis produktu

#### CIRRUS DUO 5mg+120mg 6 tabl.

Cirrus Duo to produkt leczniczy o działaniu przeciwalergicznym i udrażniającym nos, do stosowania w uczuciu zatkanego nosa oraz zapaleniu błony śluzowej nosa (kichanie, katar, swędzenie, alergia).

Cirrus Duo zawiera 2 substancje czynne, które odpowiednio odpowiadają za działanie przeciwalergiczne (cetyryzyna) i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa (pseudoefedryna). Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa. Cirrus Duo łagodzi objawy związane z całorocznym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

#### Wskazania:

Leczenie objawowe sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa - katar, świąd nosa i spojówek).

#### Skład:

Substancjami czynnymi są: pseudoefedryna (Pseudoephedrini hydrochloridum) i cetyryzyna (Cetirizini dihydrochloridum).

1 tabletkę zawiera 5 mg dichlorowodoru cetyryzyny (w postaci o natychmiastowym uwalnianiu) i 120 mg chlorowodoru pseudoefedryny (w postaci o przedłużonym uwalnianiu).

Substancje pomocnicze: warstwa o natychmiastowym uwalnianiu: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; warstwa o przedłużonym uwalnianiu: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka Opadry Y-1-7000 white: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

#### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Lek do stosowania doustnego.

Cirrus należy przyjmować w czasie lub między posiłkami.

Tabletek nie wolno rozgryzać, żuć, dzielić i kruszyć. Połykać w całości.

W przypadku nasilenia objawów lub ich nieustąpienia po 5 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Leku nie wolno stosować dłużej niż 2-3 tygodnie.



Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby: dawkę należy zmniejszyć do 1 tabletki na dobę.

**Przeciwwskazania:**

Kiedy nie stosować leku Cirrus Duo:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne leku (cetyryzyna, pseudoefedryna), efedrynę, piperazynę lub jej pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w czasie ciąży i karmienia piersią,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężką chorobę niedokrwinną serca, ciężką niewydolność nerek, niewyrównaną nadczynność tarczycy, ciężkie zaburzenia rytmu serca, guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskrę, zwiększone ciśnienie śródgałkowe,
- jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu,
- jeśli pacjent przeżył udar mózgu,
- jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu,
- jeśli są stosowane leki jak dihydroergotamina, inhibitory MAO (lub w ostatnich 26 tygodniach IMAO były przyjmowane),
- u osób poniżej 12 lat.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta stwierdzono: cukrzycę, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwinną serca, zaburzenia rytmu serca, umiarkowaną niewydolność nerek lub wątroby.

Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, jeśli pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne (np. zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie), TLPD, leki przeciwnadciśnieniowe, leki hamujące czynność OUN, glikozydy nasercowe (digoksyna), u pacjentów z przerostem gruczoły krokowego lub przy trudnościach z oddawaniem moczu.

Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru krwotocznego mózgu.

Łączne stosowanie pseudoefedryny i NLPZ może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego.

Przed zastosowaniem leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby należy poradzić się lekarza.

Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.