

ETOPIRYNA PRO 0,5 g 10 tabl.



Cena: 3,85 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

ETOPIRYNA PRO 0,5 g 10 tabl.

Wskazania:

ETOPIRYNA PRO to lek wskazany do stosowania w przypadku dolegliwości bólowych różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów; dolegliwości towarzyszących przeziębieniu i grypie z gorączką. Można go również stosować w przypadku stanów chorobowych wymagających długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów, ale jedynie z przepisu lekarza.

ETOPIRYNA PRO zawiera kwas acetylosalicylowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Tabletki dojelitowe rozpadają się dopiero w jelicie cienkim, dzięki czemu zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Skład:

substancja czynna leku: kwas acetylosalicylowy

Każda tabletki dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

pozostałe składniki: skrobia kukurydziana;skrobia kukurydziana modyfikowana;hypromeloza;kopolimer kwasu metakrylowego;talk;tytanu dwutlenek(E171);trietylu cytrynian;czerwień koszenilowa,lak (E124);krzemionka koloidalna bezwodna;sodu wodorowęglan;sodu laurylosiarczan

Dawkowanie i sposób użycia:

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

- Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwykle stosuje się:

Dorośli: jednorazowo od 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek). W razie potrzeby dawkę można powtarzać 2 lub 3 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej niż 3000mg na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 16 lat, wyłącznie na zlecenie lekarza: 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) na dobę.

Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.