

GranuSEPT Roztwór do przemywania ran 250ml



Cena: 31,35 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Postać	-
Producent	HEXANOVA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

GranuSEPT Roztwór do przemywania ran 250ml

Produkt GranuSept to zmodyfikowany roztwór wody, stabilizowany kwasem podchlorynowym, który służy przede wszystkim zmianie środowiska rany.

Roztwór stosuje się do oczyszczania, przemywania i nawilżania ran. Może być stosowany na rany ostre i przewlekłe. Jest przeznaczony do stosowania w przypadkach: drobnych otarć skóry, niewielkich skaleczeń, podrażnień, rozcięć, oparzeń. Można stosować również na nieuszkodzoną skórę. Nawilża ranę.

Produkt nie zawiera alkoholu i nie wymaga spłukiwania. Wyrób medyczny GranuSept może być stosowany u noworodków i dzieci.

Kwas podchloryny (HOCL) to naturalny związek wytwarzany przez komórki układu odpornościowego (neutrofile). HOCL jest naturalną odpowiedzią białych krwinek układu odpornościowego na grzyby, bakterie oraz wirusy, które wywołują w organizmie infekcje. Kwas podchloryny ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze.

Kwas podchloryny (HOCL) zaliczany do podchlorynów jest rekomendowany przez polskie, europejskie i amerykańskie Towarzystwa Leczenia Ran.

GranuSept roztwór służy do:

- oczyszczania ran oraz zapobiegania infekcjom,
- stosowania w przypadku drobnych otarć skóry, skaleczeń, rozcięć, poparzeń,
- przemywania ran,
- nawilżania ran,
- stosowania na podrażnioną i zainfekowaną skórę,
- nawilżenia opatrunku rany jak i samej rany, a także do rozmiękczenia zaschniętego opatrunku.

Skład:

Kwas podchloryny 0,016%, substancje pomocnicze: woda jonizowana, chlorek sodu.



Sposób użycia:

Roztwór nanieść na obszar rany, aby przemyć ranę i usunąć z niej zanieczyszczenia. Stosować według potrzeb, aby zapewnić optymalne warunki gojenia. Dla optymalnego efektu, po nałożeniu należy poczekać, aż naturalnie wyschnie.

Ostrzeżenia:

Preparatu nie należy stosować w przypadku rozpoznanej reakcji alergicznej lub nietolerancji na którykolwiek z jego składników. Nie należy połykać. Wyłącznie do stosowania miejscowego. Nie należy stosować dłużej niż 30 dni. Produkt może być stosowany równocześnie z innymi lekami wyłącznie po konsultacji lekarskiej.