

GRIPAXIN C37 10ml



Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml (butelka)
Postać	krople
Producent	ASEPTA S.C.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

GRIPAXIN C37 10ml krople

Gripaxin C37 to suplement diety dla dorosłych w postaci kropli, zawierający połączenie olejków z majeranku, bazylii, cynamonowca kamforowego oraz ekstraktu z czystka. Preparat doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie codziennej diety w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym.

Dzięki zawartości naturalnych olejków eterycznych, preparat wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Nawilża gardło poprzez wzmożenie wydzielania śluzu.

Olejek z majeranku zwiększa fizjologiczną odporność organizmu w trudnych warunkach atmosferycznych, a także pomaga przy trawieniu i oczyszczaniu organizmu.

Olejek z bazylii łagodzi przeziębienie i kaszel.

Ekstrakt z czystka jest źródłem przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki przed wolnymi rodnikami i wspierają układ odpornościowy.

Opakowanie 10 ml Gripaxin C37 wystarcza na około 3 tygodnie stosowania.

Skład:

Oliwa z oliwek; olejek z majeranku (*Origanum majorana*) 10%; olejek z bazylii (*Ocimum basilicum* L) 4%; olejek z cynamonowca kamforowego (*Cinnamomum Camphora* L.) 1%; ekstrakt z czystka (*Cistus Incanus*).

1 kropla zawiera:

olejek z majeranku 1,46 mg, olejek z bazylii 0,57 mg.

8 kropli zawiera:

olejek z majeranku 11,72 mg, olejek z bazylii 4,69 mg.

12 kropli zawiera:



olejek z majeranku 17,58 mg, olejek z bazylii 10,97 mg.

24 krople zawierają:

olejek z majeranku 35,04 mg, olejek z bazylii 13,68 mg.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli: od 4 do 6 kropli, 2-4 razy dziennie.

Rozcieńczyć w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku. Dobrze wymieszać.

Można przyjmować olejek z serkiem homogenizowanym lub z przetartymi zupami bądź rozcieńczony w maślanie, jogurcie lub kefirze.

W celu dodatkowego wzmocnienia flory jelitowej należy podczas przyjmowania olejku spożywać produkty powstałe w wyniku skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę kiszoną itp.

W czasie stosowania preparatu należy zwiększyć ilość spożywanych płynów.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią i u dzieci.