

IBUTEVA MAX 400mg 24 tabl.

Cena: 11,00 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	24 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

IBUTEVA MAX 400mg 24 tabl.

Tabletki powlekane IbuTeva Max to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz przeciwgorączkowy. IbuTeva Max zawiera ibuprofen z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i stosuje się go w łagodnych oraz średnio nasilonych bólach, np. ból głowy, w tym migrenowy ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie. Lek można stosować również w celu zmniejszenia gorączki.

Skład:

1 tabletka zawiera: substancję czynną: ibuprofen 400mg, substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropylceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk, otoczka tabletki (Opadry White 06B28499): hypromeloza 5cP, hypromeloza 15cP, hypromeloza 50cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171). Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Dawkowanie:

- W przypadku bólu o łagodnym do umiarkowanego nasileniu i gorączce:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia (o masie od 40kg): 1/2 do 1 tabletki dziennie podawanej w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 3 tabletek (1200mg).

- Bóle migrenowe:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1 tabletka podawana 1-3 razy na dobę, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg).

- Bolesne miesiączkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 roku życia (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1/2 do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg) na dobę.



Tabletki należy połykać w trakcie lub po posiłku, popijając szklanką wody. Dla ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki, tabletkę można podzielić na pół.

Przeciwwskazania:

Leku IbuTeva Max nie należy przyjmować:

- gdy pacjent jest uczulony na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,
- jeżeli wystąpiła u pacjenta reakcja nadwrażliwości,
- w chorobie wrzodowej lub krwawieniach w żołądku lub dwunastnicy związanych z przyjmowaniem leków NLPZ lub gdy w przeszłości wystąpiły przynajmniej dwa takie krwawienia,
- gdy pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca,
- gdy pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
- gdy pacjent jest znacznie odwodniony,
- gdy występuje czynne krwawienie,
- gdy stwierdzone zostały zaburzenia nieznanego pochodzenia, powodujące wytwarzanie nieprawidłowych komórek krwi.

Leku IbuTeva Max nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.