

INNOFER BABY zawiesina 50ml



Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Postać	zaw.
Producent	SMART PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

INNOFER BABY zawiesina 50ml

Produkt przeznaczony dla dzieci i niemowląt, zawierający żelazo elementarne w postaci zawiesiny doustnej, które jest dobrze wchłaniane, a jednocześnie łagodne dla żołądka.

Preparat zawiera żelazo elementarne, które:

- posiada status bezpieczeństwa GRAS (ang. Generally Recognized As Safe), nadawany przez Amerykański Departament Zdrowia; oznaczający, że substancja, na podstawie wielu badań, została uznana generalnie za bezpieczną;
- według badań przeprowadzanych również na niemowlętach i dzieciach, nie wywołuje działań niepożądanych, takich jak zaparcia, biegunki czy bóle brzucha. Ponadto nie utlenia się w jamie ustnej, dzięki czemu nie zabarwia zębów i nie ma metalicznego posmaku;
- jest na zerowym stopniu utlenienia i utlenia się w żołądku pod wpływem działania kwasu solnego do łatwo przyswajalnych jonów dwuwartościowych. Przekształcenie do formy jonowej jest rozłożone w czasie i przebiega w sposób łagodny nie powodując powstania nadmiaru jonów podrażniających śluzówkę;
- ma bardzo wysoką biodostępność na poziomie 69%, co w połączeniu z precyzją dawkowania gwarantuje, że zostanie wchłonięte i nie spowoduje powstania groźnego nadmiaru wolnych jonów.

Skład:

Olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.

100ml preparatu zawiera:

- wartość energetyczna 3346kJ/793kcal
- tłuszcz 96g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 96g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone mniej niż 0,1g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, białko 0g, sól mniej niż 0,01g, żelazo 1000mg (7143%)*



Sposób użycia:

Dawkowanie i długość stosowania uzależnione są od stopnia niedoboru żelaza i powinny odbywać się według zaleceń lekarza i pod jego nadzorem.

Przed użyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać. W tym celu należy energicznie wstrząsać butelką nie krócej niż 30 sekund do uzyskania ciemnej barwy. Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut od uzyskania jednorodnej zawiesiny. Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.

0,1ml = 1mg żelaza

1ml = 10mg żelaza