

KŁĄCZE PIĘCIORNIKA KAWON 50g



Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------|
| Opakowanie | 50 g |
| Postać | ziola do zaparzania |
| Producent | HERBAPOL-LUBLIN S.A. |
| Rejestracja | Lek ziołowy |
| Substancja czynna | Rhizoma Tormentillae |

Opis produktu

KŁĄCZE PIĘCIORNIKA KAWON 50g

Wskazania:

Tradycyjnie stosowany w objawowym leczeniu łagodnych biegunek oraz w objawowym leczeniu niewielkich stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Skład:

Potentilla erecta (L.) Raeusch (*Potentilla tormentilla* Stokes), rhizoma (kłącze pięciornika)

Dawkowanie i sposób przygotowania:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku.

W objawowym leczeniu łagodnych biegunek: ½ łyżeczki (ok. 2g) kłącza pięciornika zalać ¾ szklanki (ok. 150ml) wody, gotować powoli pod przykryciem 15 minut, ostudzić, przecedzić. Pić po ¾ szklanki odwaru do 3 razy dziennie. Maksymalna dawka dobową leku wynosi 6 g.

W objawowym leczeniu niewielkich stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej: ½ łyżeczki (ok. 2g) kłącza pięciornika zalać ½ szklanki (ok. 100ml) wody, gotować powoli pod przykryciem 15 minut, ostudzić, przecedzić. Świeżo przygotowany odwar stosować do płukania jamy ustnej i gardła kilka razy dziennie.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni w objawowym leczeniu łagodnych biegunek lub dłużej niż tydzień (7 dni) w objawowym leczeniu niewielkich stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, pomimo stosowania produktu leczniczego, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kłącze pięciornika.



Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

W objawowym leczeniu łagodnych biegunek: Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.

W objawowym leczeniu łagodnych biegunek oraz w objawowym leczeniu niewielkich stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej: Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Jeżeli objawy nasiliły się w czasie stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:

Produkt stosowany doustnie w biegunkach może opóźnić wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków, dlatego powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę lub więcej przed lub po zastosowaniu innych leków.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Działania niepożądane:

W przypadku stosowania doustnego w biegunkach mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i wymioty. Częstotliwość występowania tych objawów niepożądanych nie jest znana.