

KROPLE NA NERKI (SOLIDAGINIS) 100ml



Cena: 19,50 PLN

Opis produktu

Bonifraterskie lecznicze krople na układ moczowy i prostatę

Ziołowy lek **Krople złożone Solidaginis** jest bonifraterskim produktem roślinnym skomponowanym z naturalnych składników do stosowania w przypadku chorób nerek i dróg moczowych. Zbilansowana kompozycja roślinna w płynnej formie działa moczopędnie i rozkurczowo na mięśniówkę układu moczowego oraz przeciwzapalnie i oczyszczająco. Takie właściwości pozwalają na zastosowanie kropli Solidaginis w leczeniu szeregu dolegliwości ze strony układu moczowego. Jako **ziołowy lek moczopędny i odkażający** sprawdza się w naturalnej terapii infekcji i stanów zapalnych pęcherza i dróg moczowych, a działanie spazmolityczne dodatkowo rozszerza tym roślinnym kroplom możliwość stosowania także w przypadku kamicy nerkowej oraz w fitoterapii zapalenia i przerostu prostaty (zarówno lecniczo jak i profilaktycznie).

Dlaczego Solidaginis? – bo z ziela nawłoci

Nawłóć, ale też drapacz, nagietek, jarzębina i pokrzywa – bogaty **zestaw ziół w leczniczych kroplach od Braci Bonifratrów**. Zakonna receptura tradycyjnego leku ziołowego została stworzona w trosce o **zdrowy układ moczowy** i prawidłowe funkcjonowanie nerek.

Wskazania do stosowania Kropli złożonych Solidaginis:

Łagodne stany zapalne dróg moczowych oraz pomocniczo w kamicy układu moczowego oraz przerście prostaty. Działa moczopędnie i łagodnie odkażająco.

Skład bonifraterskich kropli na nerki :



1 ml kropli zawiera 1 ml nalewki złożonej (*Tincturae compositae*), która zawiera:
Solidago virgaurea herba (ziele nawłoci pospolitej),
Calendula officinalis flos (kwiat nagietka),
Cnicus benedictus herba (ziele drapacza lekarskiego),
Sorbus aucuparia fructus (owoc jarzębiny),
Urtica dioica, *Urtica urens folium* (liść pokrzywy),
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 66-72% (V/V).

Dawkowanie kropli Solidaginis:

Zalecana dawka jednorazowa to 30-40 kropli. Przyjmować 3 razy dziennie na dobę po posiłku. Odmierzoną porcję leku rozcieńczyć połową szklanki wody i wypić.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować leku, jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).
- Uczulenie na którykolwiek składnik leku
- Obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca lub nerek.
- Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba refluksowa przewodu pokarmowego - możliwe nasilenie wydzielania kwasu żołądkowego.
- Uszkodzenie wątroby, choroba alkoholowa, padaczka, uszkodzenie mózgu lub choroba umysłowa.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
- Dzieci poniżej 18 roku życia.
- Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania syntetycznych leków moczopędnych.