

LAREMID 2mg 20 tabl.



Cena: 16,27 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Loperamidum

Opis produktu

LAREMID 2mg 20 tabl.

Wskazania:

Laremid jest lekiem wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki różnego pochodzenia (z wyjątkiem ostrych biegunek bakteryjnych). Lek zmniejsza liczbę i objętość stolców oraz zwiększa ich konsystencję w przypadku pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego. Przenaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Laremid to lek przeciwbiegunkowy. Wydłuża on czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz redukuje natychmiastową potrzebę wypróżnienia. W efekcie prowadzi do redukcji częstości i liczby wypróżnień.

Laremid leczy biegunkę jedynie objawowo. W każdym przypadku, gdy możliwe jest ustalenie przyczyny biegunki, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane), lekarz zaleci odpowiednie leczenie. W przypadku pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci, pacjentów osłabionych oraz u osób w podeszłym wieku podczas stosowania leku należy uzupełniać niedobory płynów (wody) i soli mineralnych.

Skład:

substancja czynna: loperamidu chlorowodorek

Każda tabletkę zawiera 2 mg loperamidu chlorowodoru.

pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Ostra biegunka:

początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) dla dzieci; a następnie 1 tabletkę (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu.

Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).

Jeżeli w leczeniu ostrej biegunki, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie leku Laremid należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Przewlekła biegunka:

początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców nadobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.



Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).