


# LENODIAR PEDIATRIC 12 sasz.

Cena: 34,99 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	12 sasz.
Postać	saszetki
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### LENODIAR PEDIATRIC 12 sasz.

Przeciwdziała biegunce i przywraca równowagę jelit

#### Wskazania:

Lenodiar Pediatric jest wskazany w leczeniu biegunek różnego pochodzenia (infekcje wirusowe, objawy grypowe charakteryzujące się biegunką, biegunka czynnościowa, biegunka jatrogena spowodowana przyjmowaniem leków, biegunka podróży). Zaleca się podawać dziecku odpowiednią ilość płynów w celu uniknięcia ryzyka odwodnienia. Produkt jest wskazany powyżej 1. roku życia.

Lenodiar Pediatric działa dzięki Actitan-F, roślinnemu kompleksowi molekularnemu będącemu owocem badań Aboca, który redukuje ataki biegunki oraz normalizuje konsystencję stolca, sprzyjając szybkiemu przywróceniu równowagi pracy jelit.

Actitan-F przeciwdziała zapaleniu błony śluzowej jelit, jakie pojawia się w przypadku biegunki, dzięki dwóm mechanizmom działania:

-działanie ochronne, uzyskane poprzez utworzenie powłoki o efekcie bariery, która ogranicza kontakt z mikroorganizmami oraz czynnikami drażniącymi;

-działanie przeciwutleniające, które przeciwdziała podrażnieniu błony śluzowej.

Dzięki synergii dwóch działań, Lenodiar Pediatric sprzyja szybkiemu przywróceniu prawidłowego funkcjonowania jelit i równowagi flory bakteryjnej (mikrobiota). Ze względu na swój mechanizm działania, produkt ten działa respektując fizjologię jelit, nie powodując zaparć.

Lenodiar Pediatric to produkt bez glutenu i o przyjemnym smaku.

#### Skład:

Substancje czynne: Actitan-F, roślinny kompleks molekularny tanin (z Rzepiku pospolitego, Pięciornika Kurzego Ziela) i flawonoidów (z Rumianku).

Mianowany na zawartość całkowitą tanin  $\geq 7,8\%$

Zawiera ponadto: liofilizowany sok z borówki czernicy, jeżyn, czarnego bzu, cukier trzcinowy, naturalny aromat i aromat cytrynowy, olejek eteryczny z cytryny, gumę arabską.

#### Sposób użycia:

Zaleca się zażywanie 1 saszetki co 3 godziny, maksymalnie do 4 saszetek na dobę, w zależności od nasilenia dolegliwości.

Należy rozpuścić zawartość saszetki w 10 ml wody (około 1 łyżki stołowej). W przypadku braku ustępowania biegunki lub jej zaostrzenia pomimo leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.