

LIBRAMED 138 tabl.

Cena: 102,95 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	138 tabl.
Postać	tabl.
Producent	PHARMAGEA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

LIBRAMED 138 tabl.

Wskazania:

Libramed, połączony ze zrównoważoną dietą, prawidłowym przyjmowaniem płynów oraz regularną aktywnością fizyczną, dzięki swojemu mechanizmowi działania, wskazany jest do kontroli wagi u dorosłych i u dzieci powyżej 8. roku życia.

Libramed, dzięki Policaptil Gel Retard®, działa na poziomie jelita, tworząc żel o wysokiej lepkości, który ułatwia kontrolę poposiłkowego szczytu glikemicznego, zmniejszając ilość i prędkość wchłaniania węglowodanów (efekt retard).

Wpływa to także na zmniejszenie uczucia głodu i senności poposiłkowej. Ponadto, wykorzystując ten sam mechanizm działania, Policaptil Gel Retard® ogranicza wchłanianie tłuszczów, wspomaga pasaż jelitowy i reguluje konsystencję stolca.

Skład:

Opatentowany kompleks makrocząsteczek polisacharydowych (Policaptil Gel Retard®); aromaty pomarańczowe, jabłkowe i cytrynowe.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia 3 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami

Dzieci między 8. a 12. rokiem życia 2 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami

Zażyj zalecaną dawkę, popijając pełną szklanką wody i połykając po jednej tabletkę na raz. Nie żuć i nie rozgryzać tabletki.

Osoby mające problemy z połykaniem mogą rozpuścić tabletki Libramed w letniej wodzie lub w herbatkach ziołowych niesłodzonych, mieszając do ich całkowitego rozpuszczenia. Uzyskany napój należy spożyć w ciągu kilku minut, zanim zamieni się w żel.

Przeciwwskazania:

Nie zażywać w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.