

# MAGNE B6 60 tabl. powlekanych

Cena: 25,90 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochloridum

## Opis produktu

### MAGNE B6 60 tabl. powlekanych

Lek OTC

#### Zastosowanie:

Preparat stosuje się w leczeniu niedoborów magnezu.

#### Wskazania:

- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu,
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca),
- kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

#### Skład:

- Substancjami czynnymi leku są:

jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) - 48 mg Mg<sup>2+</sup> (1,97 mmol)  
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) - 5 mg

- Substancje pomocnicze to: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934,



talk, magnezu stearynian.

Skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba.

**Dawkowanie i sposób użycia:**

- Dorośli:

6 do 8 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

- Dzieci od 6 roku życia i młodzież:

4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc.

**Przeciwwskazania:**

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.). Jednoczesne stosowanie lewodopy.