

PIROLAM LAKIER 80mg/g 4g



Cena: 69,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	4 g
Postać	lak.do pazn.lecz.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	
Substancja czynna	Ciclopiroxum

Opis produktu

PIROLAM LAKIER 80mg/g 4g

Zastosowanie:

Lek przeciwgrzybiczy w postaci lakieru do paznokci. Przeznaczony jest do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci.

Zawarty w preparacie cyklopiroks jest syntetyczną pochodną pirydynonu i wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Mechanizm działania związany jest z przenikaniem przez płytkę paznokcia i gromadzeniem się substancji czynnej w dużej ilości w komórkach chorobotwórczych grzybów, prowadząc do zaburzenia transportu substancji odżywczych. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozpad komórek grzyba.

Skład:
substancją czynną leku jest cyklopiroks. Każdy gram lakieru zawiera substancję czynną 80mg cyklopiroksu. Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem monobutylovym kwasu 2-butenodiowego.

Dawkowanie i sposób użycia:

- Przez pierwszy miesiąc stosowania: lakier nakładać co drugi dzień na chorobowo zmieniony paznokieć – etap nasycenia paznokcia cyklopiroksiem.
- Drugi miesiąc: nakładanie lakieru można ograniczyć do 2 razy w tygodniu.
- Trzeci miesiąc: stosować raz w tygodniu.

Przez cały okres leczenia należy:

- Raz w tygodniu zmyć lakier za pomocą zmywacza kosmetycznego. Ma to na celu zapewnienie prawidłowe wnikanie substancji czynnej w płytkę paznokcia.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru spiłować płytkę jednorazowym pilnikiem, który następnie wyrzucić.



Jeśli warstwa lakieru została uszkodzona należy ją uzupełnić w ubytkach.

Czas trwania leczenia grzybicy zależy od indywidualnych czynników, głównym jest tempo wzrostu płytki paznokcia oraz stopnia zakażenia. W przypadku dłoni leczenie trwa średnio około 6 miesięcy, a u stóp do 12 miesięcy. Stosowanie preparatu należy kontynuować do momentu odrośnięcia zdrowego paznokcia. Zalecany czas leczenia w przypadku dłoni to co najmniej 3 miesiące, u stóp 6 miesięcy.

Nie należy stosować lakieru dłużej niż przez 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.