

PROCTO-GLYVENOL czopki doodbytnicze 400 mg + 40 mg 10 szt.

Cena: 39,14 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 czop. (2 blist. po 5 szt.)
Postać	czop.doodbyt.
Producent	RECORDATI IRELAND LTD.
Rejestracja	
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocainum

Opis produktu

PROCTO-GLYVENOL czopki doodbytnicze 400 mg + 40 mg 10 szt.

Czopki doobytncze Procto-Glyvenol to lek na hemoroidy, zawierający dwa składniki aktywne o uzupełniającym się działaniu. Zawarty w leku tribenozyd zmniejsza stan zapalny, obrzęk oraz świąd. Dodatek lidokainy w czopkach powoduje miejscowe znieczulenie. Czopki można stosować u osób dorosłych oraz od 4 miesiąca ciąży i podczas laktacji.

Czopki Procto-Glyvenol działają dwukierunkowo. Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Natomiast lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu.

Wskazania:

Lek Procto-Glyvenol stosowany jest w miejscowym leczeniu zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokaina (Lidocainum).

1 czopek doobytnczy zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy.
Substancje pomocnicze: tłuszcz (Witepsol E85), tłuszcz (Witepsol W35).

Dawkowanie:

Lek podaje doodbytniczo.

Zalecana dawkowanie leku Procto-Glyvenol to 1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

Przeciwwskazania:



Nie stosować czopków Procto-Glyvenol u osób nadwrażliwych na tribenozyd, lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób): reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Procto-Glyvenol u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.

W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.

Nie wolno stosować leku doustnie. Należy unikać kontaktu z oczami.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży. Czopki na hemoroidy można stosować od 4 miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.