


PYRANTELUM zawiesina 15ml



Cena: 15,49 PLN

Opis produktu

PYRANTELUM zawiesina 15ml

Lek stosuje się przy owsicy u dzieci od 2 roku życia i dorosłych, wywołaną przez *Enterobius vermicularis*.

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelium Medana jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Skład:

W 5 ml zawiesiny doustnej znajduje się 250 mg pyrantelu w postaci pyrantelu embonianu (721 mg). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 70% (5 ml zawiesiny zawiera 3,06 g sorbitolu).

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli i dzieci:

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg to: 11 mg/kg mc. jednorazowo.

Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie w zależności od masy ciała:

- 11-16kg: 2,5ml (125mg),
- 17-28kg: 5,0ml (250mg),
- 29-39kg: 7,5ml (357mg),
- 40-50kg: 10ml (500mg),
- 51-62kg: 12,5ml (625mg),
- 63-75kg: 15ml (750mg),
- dorośli o masie ciała > 75kg: 20ml (1000mg).

Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie ma



konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie piperazyny. Stosowanie w czasie leczenia miastonii.

Ciąża - nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana w okresie ciąży. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią - nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.