

# RANISEPTOL BLIZNY żel 20ml



Cena: 22,95 PLN

## Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Opakowanie        | 20 ml                    |
| Postać            | żel                      |
| Producent         | N.P.ZDROVIT SP Z O.O.    |
| Rejestracja       | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | -                        |

## Opis produktu

### RANISEPTOL BLIZNY żel 20ml

Raniseptol Blizny to silikonowy żel na blizny przeznaczony do stosowania miejscowego w celu wspomagania leczenia blizn różnego pochodzenia. Stosowany systematycznie wspomaga leczenie blizn przerostowych i bliznowców (keloidów) oraz pomaga zapobiegać nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych.

Zalecany jest wspomagająco w leczeniu: blizn po zabiegach chirurgicznych i po operacjach (w tym blizny po cesarskim cięciu), blizn po operacjach plastycznych i zabiegach laserowych, blizn po oparzeniach, blizn potrądkowych, blizn pourazowych, blizn przerostowych, bliznowców (keloidów), rozstępów.

#### Skład:

Mieszanina polisiloksanów, Dwutlenek krzemu.

#### Sposób użycia:

Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość żelu i masować ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Należy rozcierać bliznę lekko uciskając ją opuszkami palców. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem ewentualnych szwów.

#### Przeciwwskazania:

- nie stosować żelu na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę i błony śluzowe,
- nie należy stosować na blizny, na które wcześniej zaaplikowano leki lub inne preparaty. Na zaaplikowany żel Raniseptol blizny nie nakładać innych preparatów zawierających leki (w tym antybiotyki),
- nie należy stosować wyrobu jeśli na skórze w okolicach blizny występują odczyny alergiczne lub inne zmiany chorobowe,
- nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu i skonsultować się z lekarzem,
- nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone,
- przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"  
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa  
729 888 387