


RAPHACHOLIN C 30 tabl.

Cena: 12,74 PLN



Opis produktu

RAPHACHOLIN C 30 tabl.

Raphacholin C zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym (1:1), wyciąg gęsty z zieleń karczocha, kwas dehydrocholowy oraz olejek miętowy.

Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci).

Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci, co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmacnia ruchy perystaltyczne jelit.

Wskazania:

Raphacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego

Skład:

1 tabletki drażowana zawiera:

Substancje czynne: *Raphani sativi nigri radices extractum siccum cum carbo medicinalis*

(wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym) (1:1) – 150 mg

(DER 18:1, ekstrahent: etanol 85 % V/V)

Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z zieleń karczocha) – 47 mg

(DER 3:1, ekstrahent: etanol 50 % V/V)

Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) – 40 mg

Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) – 15 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, substancja barwiąca (tlenek żelaza czarny + dwutlenek tytanu).

Dawkowanie:

Dorośli – w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2 tabletek 30 min. po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem.

Po konsultacji z lekarzem, u dzieci powyżej 10 lat 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Raphacholin C niż zalecana:

W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki (jednorazowe przyjęcie kilkudziesięciu tabletek drażowanych), sporadycznie mogą wystąpić wymioty, biegunka, dyselektrolitemia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudność

Stosowanie innych leków:



Dotychczas nie opisano istotnych interakcji z innymi lekami. W dużych dawkach z lekami hipotensyjnymi i moczopędnymi, potencjalnie może powodować hipokaliemię.

Działanie niepożądane:

Jak każdy lek, Raphacholin C może powodować działania niepożądane. Sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na składniki leku. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Informacje dodatkowe:

Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, ciężkich chorobach wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.

Po konsultacji z lekarzem można stosować u dzieci powyżej 10 roku życia 1 tabletkę drażowaną 3 razy dziennie po posiłku.

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w ciąży.

Niektóre składniki preparatu przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.