

# REUMAPHYT 65 kaps.



Cena: 32,49 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	65 kaps.
Postać	kaps.twarde
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Harpagophytum procumbens

## Opis produktu

### Reumaphyt - ziołowe tabletki na bóle stawów

Reumaphyt to roślinny lek w postaci kapsułek stosowany w łagodnych bólach stawowych. Substancją czynną leku stanowi suchy wyciąg wodny z korzenia hakorośli rozestanej Harpagophyti radice extractum siccum. Lek przeznaczony dla osób dorosłych.

#### Skład:

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z korzenia hakorośli rozestanej (Harpagophytum procumbens, DC) (1,5 – 2,5:1).  
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

1 kapsułka zawiera 250 mg wyciągu z korzenia hakorośli rozestanej (Harpagophytum procumbens, DC) (1,5-2,5:1)  
Substancje pomocnicze: wypełnienie kapsułki: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, bezwodna krzemionka koloidalna. Otoczka kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu E 171.

#### Dawkowanie:

Lek do stosowania doustnego.  
Dorośli: 2 razy dziennie po 1 - 3 kapsułki.  
Nie zaleca się stosowania Reumaphyt dłużej niż przez 28 dni bez konsultacji lekarskiej.

#### Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku:  
w przypadku nadwrażliwości na korzeń hakorośli lub którykolwiek ze składników,  
w chorobie wrzodowej żołądka lub jelit.

#### Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.



**Możliwe działania niepożądane:**

objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha),  
objawy ze strony układu nerwowego (zawroty, ból głowy),  
reakcje skórne o podłożu alergicznym.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Reumaphyt pobudza łaknienie.

Pacjenci, u których stwierdzono nadwrażliwość na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.

Jeśli bólowi stawów towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie lub gorączka należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z kamicą dróg żółciowych oraz pacjenci z chorobami serca mogą stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

**Ciąża i karmienie piersią:**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z powodu braku danych nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.