

SALVIASEPT 35g



Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	38 ml
Postać	konc.do s.rozt.do pł.gardła
Producent	HERBAPOL-LUBLIN S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

Opis produktu

SALVIASEPT 35g

Informacje ogólne:

Salviasept jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, do płukania jamy ustnej i gardła. W swoim składzie zawiera kompozycję olejków eterycznych: szałwiowego, tymiankowego, goździkowego, majerankowego, miętowego; mentol i cyneol oraz wyciąg płynny złożony z ziół: rumianku, szaławii, krwawnika, mięty, tymianku i kopru.

Lek jest stosowany tradycyjnie jako środek antyseptyczny i przeciwzapalny na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

Wskazania: tradycyjnie w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Skład:

Olejek goździkowy (*Syzygium aromaticum* L., Merrill et L. M. Perry, aetheroleum) 2g

mentol (*Mentholum*) 2g

olejek miętowy (*Mentha x piperita* L., aetheroleum) 1,1g

cyneol (*Cineolum*) 0,6g

olejek tymiankowy (*Thymus vulgaris* L., *Thymus zygis* Loefl. ex L.; aetheroleum) 0,3g

olejek majerankowy (*Origanum majorana* L., aetheroleum) 0,3g

olejek szałwiowy (*Salvia officinalis* L., aetheroleum) 0,2g

oraz 93,5 g wyciągu płynnego złożonego (1:3,3) otrzymanego z:

koszyczków rumianku (*Matricaria recutita* L., flos) 18,7 cz.

liści szaławii (*Salvia officinalis* L., folium) 18,7 cz.

ziela krwawnika (*Achillea millefolium* L., herba) 18,7 cz.

ziela mięty pieprzowej (*Mentha x piperita* L., herba) 18,7 cz.

ziela tymianku (*Thymus vulgaris* L., *Thymus zygis* Loefl. ex L.; herba) 9,35 cz.

owoców kopru (*Foeniculum vulgare* Miller sp. *vulgare* var. *vulgare*, fructus) 9,35 cz.

Lek zawiera 58% (V/V) ± 10% alkoholu (etanolu).

Dawkowanie i sposób użycia:

Lek stosuje się na błony śluzowe jamy ustnej oraz dogardłowo.

Dorośli: 50 kropli koncentratu rozcieńczyć w ½ szklanki ciepłej wody. Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną i gardło 3 razy



na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Działanie niepożądanego:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne (duszność, obrzęk Quinckiego

(opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), zapaść naczyniowa, wstrząs anafilaktyczny),

- uczucie pieczenia (przy silniejszym podrażnieniu błony śluzowej jamy ustnej), bóle głowy,

drżenie mięśni, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów),

- bradykardia,
- podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej,
- kontaktowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, swędzenie,

wysypka rumieniowa.

Kontaktowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej obserwowano m.in. u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej, nawracającym owrzodzeniem jamy ustnej lub reakcją liszajową.