

## SCORBOLAMID 20 tabl.



Cena: 14,90 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.drażow.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Salicylamidum, Rutosidum, Acidum ascorbicum

### Opis produktu

#### SCORBOLAMID 20 tabl.

##### Wskazania:

Gorączka i ból związany z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

##### Właściwości:

Salicylamid - działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.

Rutozyd - wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.

Kwas askorbinowy (witamina C) – uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.

##### Skład:

1 tabletki drażowana zawiera: substancje czynne: 300mg salicylamidu, 100mg kwasu askorbinowego, 5mg rutozydu oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiące rdzeń tabletki drażowanej) oraz sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), воск Carnauba i woda oczyszczona (stanowiące otoczkę).

##### Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 6 lat: doustnie, zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę. Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo popić szklanką wody lub mleka. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.

##### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na salicylamid lub inne składniki leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbinowego); przyjmowaniu kwasu askorbinowego); kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbinowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; ciąża; karmienie piersią.



Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"  
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa  
729 888 387