


SIRUPUS PINI COMPOSITUS syrop 125g



Cena: 6,19 PLN

Opis produktu

SIRUPUS PINI COMPOSITUS syrop 125g

Syrop pini (sosnowy) stosowany jest pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z intensywnym kaszlem i uczuciem duszności.

Wskazania:

Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Działanie:

Jest to produkt leczniczy zawierający w swoim składzie fosforan kodeiny o działaniu przeciwkaszlowym.

Skład:

100 g syropu zawiera: Pini extractum fluidum (wyciąg sosnowy płynny – 1:1) - 6,6 g; Foeniculi tinctura (nalewka z owocu kopru włoskiego – 4,5-5:1) - 1,0 g; Codeini phosphas hemihydricus (fosforan kodeiny półwodny) - 0,05 g.

Substancje pomocnicze: mleczan wapnia pięciowodny, kwas fosforowy, sacharoza, woda oczyszczona.

Syrop w jednej dawce (15 ml) zawiera 9,6 mg fosforanu kodeiny.

100 g syropu zawiera 62 g sacharozy.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 15ml syropu.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat syrop można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Sirupus Pini compositum:



Ze względu na zawartość etanolu lek nie może być stosowany przy uszkodzeniu wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu i chorobach umysłowych.

Nie zaleca się stosowania w chorobach układu oddechowego przebiegających z zaleganiem gęstej wydzieliny w drzewie oskrzelowym i z utrudnionym odkrztuszaniem.

Nadwrażliwość na składniki leku.

Nie stosować u osób z astmą oskrzelową lub tendencją do skurczu oskrzeli, w ostrej niewydolności oddechowej.

Nie stosować u pacjentów z przewlekłym zaparciem.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat, natomiast u dzieci w wieku 6-12 należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych na którykolwiek składnik leku może wystąpić reakcja alergiczna.

Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, spadki ciśnienia, zmniejszenie częstości oddechu, skurcz oskrzeli, trudności w oddawaniu moczu, zaparcia, kolka żółciowa, nudności, wymioty, uczucie suchości w jamie ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat, natomiast u dzieci w wieku 6-12 należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.