

SLOW-MAG B6 50 tabl.

Cena: 18,89 PLN



Opis produktu

SLOW-MAG B6 50 tabl.

Wskazania do stosowania:

Niedobory magnezu i witaminy B6.

Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany zmęczenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.

Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

Skład:

Substancjami czynnymi są: magnez (w postaci soli) (Magnesii chloridum hexahydricum) i pirydoksyna (Pyridoxini hydrochloridum).

1 tabletkę zawiera 64 mg jonów magnezu (w postaci magnezu chlorku sześciowodnego) oraz 5 mg witaminy B6 (chlorowodrek pirydoksyny).

Substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylo sebacynian, talk.

Dawkowanie:

Dorośli:

W profilaktyce: 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

W niedoborze magnezu i witaminy B6: 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.

Dzieci powyżej 12 lat – w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

Tabletki należy łykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Przeciwwskazania:



Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi, znaczne niedociśnienie tętnicze, ciężka niewydolność nerek.
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.