

## STARAZOLIN 0,5 mg/ml KROPLE DO OCZU 2x5ml

Cena: 12,43 PLN



### Opis produktu

#### STARAZOLIN 0,5 mg/ml KROPLE DO OCZU 2x5ml

Zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek.

#### Wskazania do stosowania:

Leczenie objawowe przy obrzęku i przekrwieniu spojówek, wywołane czynnikami drażniącymi, takimi jak: kurz, dym, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki oraz soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw.

Starazolin łagodzi pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie oczu.

Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.

Lek w butelce 5 ml nadaje się do użytku w ciągu **28 dni** od pierwszego otwarcia butelki.

Podczas stosowania leku należy przerwać noszenie miękkich soczewek kontaktowych

#### Przeciwwskazania:

- uczulenie na tetryzolinochlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- stosowanie u dzieci poniżej 2 lat;

jaskra, szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia oczu;

- ciąża lub karmienie piersią.
- infekcje, uszkodzenie rogówki silnego bólu;
- ciężkie choroby i układu krążenia (np. z chorobą wieńcową) i nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnercza;
- cukrzyca i nadczynność tarczycy, leczone inhibitorami monoaminooksydazy i innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;
- stosowanie leku równocześnie z inhibitorami MAO lub trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, guanetydyną czy rezerpiną - mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. W przypadku stosowania tych leków, lek Starazolin można stosować tylko po konsultacji z



lekarzem.

**Skład:**

Substancją czynną leku jest tetryzolina. Każdy ml kropli zawiera 0,5 mg tetryzolinę chlorowodoru.  
Pozostałe składniki: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, woda wysokoczyszczona.

**Sposób użycia:**

Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.  
Dorośli i dzieci powyżej 2 lat: zwykle wkrapla się od 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dobę.  
Należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.  
Stosowanie leku u dzieci poniżej 2 lat jest przeciwwskazane.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy zakropleniami.