SUDAFED XYLOSPRAY HA 0,1% aerozol do nosa 10ml

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu

SUDAFED XYLOSPRAY HA 0,1% aerozol do nosa 10ml

Sudafed XyloSpray HA jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Zawiera kwas hialuronowy, który nawilża błonę śluzową nosa.
Początek działania leku występuje zwykle w ciągu 5-10 minut po podaniu. Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos oraz ułatwia odpływ wydzieliny. Lek Sudafed XyloSpray HA zawiera jako substancję pomocniczą kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Wskazaniami do zastosowania Sudafed XyloSpray HA są:

- zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

Lek nie zawiera środków konserwujących.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

Skład:
Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku

Substancje pomocnicze: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w w wieku powyżej 6 lat: stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Sudafed XyloSpray Ha:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występuje suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,
- u pacjentów po usunięciu przesadki i po innych chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej,
- okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
- nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.