

SYROP TYMIANKOWY złożony 125g



Cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	125 g
Postać	-
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Thymi sirupus compositus

Opis produktu

SYROP TYMIANKOWY złożony 125g

Syrop tymiankowy złożony składa się z wyciągu tymiankowego, tymolu oraz syropu prostego (sacharoza i woda oczyszczona).

Syrop o działaniu **wykrztuśnym**, stosowany tradycyjnie w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych.

Skład:

Substancje czynne w 100 g leku:

- Thymi extractum fluidum (1:2) (Wyciąg tymiankowy płynny) – 15,00 g etanol ok. 38% (v/v)
- Thymolum (Tymol) – 0,01 g

Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy, etanol, syrop prosty (sacharoza i woda oczyszczona).

Lek zawiera nie więcej niż 5% (m/m) etanolu.

Dawkowanie i sposób użycia:

Doustnie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy na dobę po 2 łyżeczki (10 ml) syropu.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.

Dzieci poniżej 6 lat: Nie zaleca się stosowania.

Należy przyjmować dużą ilość płynów, aby umożliwić wywołanie prawidłowego odruchu wykrztuśnego i nie powodować podrażnienia układu oddechowego.

Kiedy nie stosować syropu tymiankowego złożonego:

- Syropu tymiankowego złożonego nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.



- Nie należy stosować syropu, jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na tymianek lub inne rośliny z rodziny Jasnotowate (Lamiaceae/Labiatae) lub którykolwiek ze składników leku.
- Nie stosować w astmie oraz u dzieci z ostrymi stanami zapalnymi krtani i tchawicy w wywiadzie.
- Dawka jednorazowa syropu dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat (10 ml) zawiera do 0,64 g (640 mg) etanolu, co odpowiada ok. 5 ml wina lub ok. 13 ml piwa. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową, chorobami wątroby lub padaczką.
- Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, duszności lub ropnej plwociny należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera sacharozę. Pacjenci u których stwierdzono wcześniej nietolerancję na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.
- Jeżeli mimo zastosowanego leczenia objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach należy zgłosić się do lekarza.

Syrop tymiankowy złożony a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji Syropu tymiankowego złożonego z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność

Syropu nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. Wpływ leku na płodność jest nieznan. Jeśli pacjentka może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Dotychczas nie stwierdzono, aby produkt leczniczy Syrop tymiankowy złożony przyjmowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem wywierał wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane:

Dotychczas nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania Syropu tymiankowego złożonego.

Po zastosowaniu syropu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości oraz łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Częstość występowania tych objawów nie została określona. Rzadko mogą wystąpić objawy podrażnienia żołądka (nudności, wymioty).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68