

ULGASIM 240mg 30 kaps.



Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Simeticonum

Opis produktu

ULGASIM 240mg 30 kaps.

Ulgasim to wyrób medyczny stosowany w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach.

Przeznaczony jest także do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii i radiografii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Dawkowanie i sposób użycia:

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach: Dorośli: doraźnie 1 kapsułka, 2-3 razy dziennie. Maksymalnie 3 kapsułki dziennie (720 mg symetykonu). Dzieci powyżej 12 roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych: Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Kapsułki stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Skład:

Symetykon - 240mg

Składnikami otoczek: żelatyna wieprzowa, glicerol, dwutlenek tytanu (E171).

Wyrób medyczny nie zawiera cukru.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu,
- u dzieci poniżej 12 roku życia,
- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.



Nie wolno stosować więcej niż 3 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia. Jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.

Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania preparatu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godziną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Ulgasim i innych preparatów.