

# VITA BUERLECITHIN tonik 1000ml



Cena: 54,99 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 l
Postać	płyn doustny
Producent	
Rejestracja	
Substancja czynna	Lecithinum

## Opis produktu

### VITA BUERLECITHIN tonik 1000ml

#### Wskazania:

- osłabienie pamięci i koncentracji,
- stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,
- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),
- pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
- objawy niedoboru witamin z grupy B,
- stan rekonwalescencji po przebytej chorobie,
- pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
- zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
- zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Vita buerlecithin ma optymalny skład: zawiera witaminy B2, B6 i B12, które wspomagają działanie lecytyny i regulują pracę układu nerwowego uzupełniając jednocześnie ewentualne niedobory witamin z grupy B. Lek Vita buerlecithin daje zauważalne efekty już po kilku dniach stosowania, jednak dla utrzymania najlepszych efektów terapeutycznych zaleca się stosowanie go przez dłuższy czas. Preparat jest dostępny w formie łatwego do połknięcia płynu. Vita buerlecithin to lek, a nie suplement diety – ciągła kontrola i monitorowanie jakości zapewnia skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania preparatu.

#### Skład:

Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotenian, amid kwasu nikotynowego.

Pozostałe składniki to: sacharoza, etanol 96%, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilowa (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek, mannitol, woda oczyszczona.



- 100ml leku zawiera: lecytynę sojową (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd) 10,4g; ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2) 4,8mg (co odpowiada 3,5mg witaminy B2); pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 3,5mg; cyjanokobalaminę (witamina B12) 2,5mcg; D-pantotenian sodowy 20mg amid kwasu nikotynowego 35mg oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę, etanol i czerwień koszenilową. Lek zawiera 16,4% alkoholu.

**Dawkowanie:**

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 20 ml (jedna łyżka stołowa) 3 razy na dobę.

**Przeciwwskazania:**

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Vita buerlecithin jest uczulenie na substancje czynne, orzechy, soję bądź inne składniki preparatu. Ze względu na zawartość alkoholu leku Vita buerlecithin w postaci płynu nie powinny przyjmować osoby ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką lub uszkodzeniami mózgu. Należy zachować ostrożność podczas obsługiwanie maszyn i prowadzenia pojazdów. Niewskazane jest stosowanie leku Vita buerlecithin płyn u dzieci poniżej 12. roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Leku Vita buerlecithin nie należy przyjmować wraz z lekami psychotropowymi oraz wchodzącymi w interakcje z alkoholem, tj. leki uspokajające, przeciwpadaczkowe, nasenne.