

VITAMINUM B6 TEVA 50mg 50 tabl.

Cena: 5,51 PLN



Opis produktu

VITAMINUM B6 TEVA 50mg 50 tabl.

Vitaminum B6 Teva to lek zawierający witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Dodatkowo wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Witamina B6 znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe związane z jej niedoborem. Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.

Wskazania:

Vitaminum B6 Teva stosuje się w przebiegu stanów niedoboru witaminy B6 oraz schorzeń wymagających podawania pirydoksyny, takich jak:

- leczenie i zapobieganie polineuropatii obwodowej,
- przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych,
- zespołów złego wchłaniania (np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem),
- oparzeń słonecznych i pooparzeniowych zmiany barwnikowych skóry (zapobiegawczo),
- zapalenia skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej-akrodynia) i zapaleniu języka,
- choroby przyzębia,
- niektórych wrodzonych zaburzeń metabolicznych.

Skład:

Substancją czynną leku jest chlorowodorek pirydoksyny (Pyridoxini hydrochloridum).

Jedna tabletkę zawiera 50mg witaminy B6.

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, żelatyna.

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Nie stosować w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Dawkowanie:

Dorośli:



- Leczniczo: najczęściej od 50 do 100 mg 3 razy na dobę.
- Zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 50mg na dobę.
- Zapobieganie oparzeniom słonecznym i poparzeniowym zmianom barwnikowym skóry: 150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach podzielonych.
- Zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych.
- Choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę;
- Pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej 50 mg do 300 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci:

Leczniczo: 25 do 150 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Vitaminum B6 Teva w przypadku:

- uczulenia, nadwrażliwości na witaminę B6 lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- choroby Parkinsona leczonej preparatem lewodopy bez inhibitora dopadekarboksylazy.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6 w dawce do 50 mg na dobę.

Witamina B6 przenika do mleka matki, ale lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6 w okresie karmienia piersią z zachowaniem specjalnej ostrożności.