

# ZENELLA MED 14 tabl. dopochwowych

Cena: 16,99 PLN



## Opis produktu

### ZENELLA MED 14 tabl. dopochwowych

Wyrób medyczny

#### Zastosowanie:

Wyrób medyczny Zenella MED poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażania się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym. Działanie Zenella MED zostało uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy, łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

#### Skład:

Kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy. Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

#### Dawkowanie i sposób użycia:

Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy: Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni.

Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Profilaktyka: Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Zenelli MED lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.

Tylko do stosowania dopochwowego.

Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik wyrobu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W przypadku występowania upławów z krwią nie stosować wyrobu Zenella MED i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Zenella MED nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Sposób postępowania z wyrobem:

#### Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie pieczenia pochwy.