

ZIELE NAWŁOCI 50g



Cena: 4,94 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	ziola do zaparzania
Producent	HERBAPOL BIA
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Virgaureae herba

Opis produktu

ZIELE NAWŁOCI 50g

Zastosowanie:

Tradycyjnie stosuje się pomocniczo w leczeniu łagodnych dolegliwości układu moczowego, jako środek zwiększający ilość wydalanego moczu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Skład:

1 g produktu zawiera 1 g ziela nawłoci pospolitej (*Solidago virgaurea* L., herba).

Dawkowanie, sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 łyżkę (ok. 3 g) ziela zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem 30 minut, przecedzić. Pić po szklance naparu 2 do 4 razy dziennie.

Lek stosuje się tradycyjnie od 2 do 4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się pomimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na nawłoc pospolitą i inne rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (dawniej złożonych Compositae). Nie podawać w chorobach, w których wskazane jest przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np. w ciężkich chorobach serca lub nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jeśli dolegliwości nasilą się, nie ustąpią lub pojawią się objawy, którym towarzyszyć będą gorączka, bolesne i utrudnione oddawanie moczu lub obecność krwi w moczu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie zaleca się stosowania łącznie z syntetycznymi lekami diuretycznymi. Jeżeli objawy nasilą się i nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:



Nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie badano wpływu produktu leczniczego na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.